

# Sýkora koňadra

*Parus major*

**Řád:** pěvci

**Čeleď:** sýkorovití

**Rod:** sýkora

**Pták:** převážně tažný v Evropě

**Chráněná - NE**



## Vzhled:

Sýkora koňadra je největší sýkora. Je veliká jako vrabec domácí. Dorůstá délky 13-15 cm. Váží 14-23 g. Hlavu má leskle černou, jen tváře a příuší bílé. Černá barva dále pokračuje na náprsenku do tenkého pruhu na břiše, který bývá u samic tenčí. Hřbet mají mechově zelený. Křídla modrošedá s výraznou bílou křídelní páskou, spodina žlutá a ocas modro šedý s bílými stranami. Zobák je silný, kuželovitý a hnědošedý, nohy šedé a duhovka hnědá. Mladí ptáci jsou zbarveni matně, mají žlutavé skvrny na tvářích bez úplného spodního černého okraje.

## Hlasový projev:

[Sýkora koňadra \(Parus major\) - hlasové projevy](#)

## Potrava:

Potrava sýkory se mění podle sezóny, na jaře a v létě vyhledává živočišnou potravu a na podzim a v zimě semennou potravu.

## Výskyt:

Sýkora koňadra má palearktické rozšíření, zahrnující celý Palearkt od Irska až po Kamčatku a také jihovýchodní Asii, Malajsii a Indonésii. V Evropě patří k nejhojnějším ptačím druhům.

## Predátoři:

Ukázalo se, že pokud se k mláděti sýkorky přiblíží jakéhokoliv přibližně stejně velký pták, bude se bát úplně stejně smrtelně nebezpečného krahujce i úplně neškodného holuba.

## Hnízdění:

Stavba trvá obvykle 2–6 dnů, ale při prvním hnízdění může trvat mnohem déle (až 20 dnů). Běžně hnízdí dvakrát ročně od dubna do července.

## Zajímavosti:

Sýkory jsou častými obyvateli ptačích budek (sýkorníků). Nabídku hnízdních možností (vyvěšení budek) oplácí požíráním hmyzu zejména larev zahradních škůdců. Budky je třeba pravidelně kontrolovat a pokaždé na podzim vyčistit, jinak se v nich hromadí parazité ptáků nebo je osídlí hmyz.

