

Polák chocholačka

(*Aythya fuligula*)

Vědecká klasifikace:


Řád: vrubozobí

Čeleď: kachnovití

Rod: polák

Pták: stěhovavý

Pták chráněný - málo dotčený



Vzhled:

Polák chocholačka je o něco menší než kachna divoká. Má poměrně dlouhé tělo, kulatou hlavu a plochý a dlouhý zobák. Samec je svým charakteristickým zbarvením ve svatebním šatě naprosto nezaměnitelný. Je leskle černý s bílými boky, modro šedým zobákem s černým koncem a charakteristickou chocholkou, díky které získal druh i svůj název. V prostém šatě, který má od léta do podzimu, je matně černý s šedohnědými boky. Samice je tmavě hnědá, boky má o něco světlejší a velice obtížně ji můžeme rozeznat od jiných druhů poláků.

Výskyt:

V České republice je polák chocholačka stále hojnou potápivou kachnou, ačkoli se její stavy pomalu snižují především díky úbytku jejího přirozeného biomu a masivnímu znečištění vod.

Potrava:

Stejně jako ostatní poláci se neumí i tento polák výborně potápět i do více než 5 metrových hloubek, kde požírá drobné měkkýše, vodní hmyz a občas i některé vodní rostliny.

Hlasový projev:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tufted_Duck.ogg

Predátoři.

Hlavními predátory jsou lidé, psi, velcí dravci, např. jestřábi

Hnízdění:

Hnízdí od května do srpna. Pozoruhodný tok, při kterém se pár vzájemně dvoří a potápí, probíhá ve vodě. Do dobře ukrytého hnízda samice klade 3 až 20 olivově zelených vajec, na kterých sedí 23 až 28 dní. Mláďata se plně osamostatňují po 45 až 50 dnech života.

Zajímavosti:

Polák chocholačka preferuje rybníky, jezera, řeky a mořské břehy s dostatečně hustým porostem, v zimě se často objevuje na parkových jezírcích. Během jara a léta žije samostatně, na konci podzimu a na zimu se však obvykle sdružuje do větších hejn. Je částečně tažný, v Česku se vyskytuje celoročně.

Stejně jako ostatní poláci se umí i tento polák výborně potápět i do více než 5 metrových hloubek, kde požívá drobné měkkýše, vodní hmyz a občas i některé vodní rostliny.

