

Krahujec obecný

Accipiter nisus



Vědecká klasifikace:

Řád: dravci

Čeleď: jestřabovití

Pták: jestřáb

Pták chráněný: ANO

Vzhled:

Samec dorůstá délky 29–34 cm a v rozpětí křídel měří 58–65 cm, samice je dlouhá 35–41 cm a v rozpětí křídel dosahuje 67–80 cm. Hmotnost samce je 105–196 g, samice 185–350 g. Samec má břidlicově šedý hřbet a křídla, rezavé tváře a hrud' a bílé, rezavě pruhované břicho.

Hlasový projev:

[Sparrow Hawk Sounds - Good Animal Voices](#)

Výskyt:

Často se vyskytuje severní Africe, Evropě a Asii. V Evropě jde o druhého nejčastějšího dravce po káněti lesním. Jeho početnost se značně snížila od 19. století. Často Krahujce uvidíte v lesích střídaných křovinami a pasekami. Můžeme ho pozorovat ve společnosti pěnkav a vrabců.

Potrava: potravu tvoří z téměř 98 % ptáci, vzácně se v ní objevují také savci, plazi a hmyz.

Predátoři: jiné zvířecí druhy co loví krahujce obecné jsou kočky a kuny. Ale největším predátorem krahujce jsou lidé, jelikož při používání pesticidů se vajíčkům krahujce ztenčila skořápka a byla menší šance na vylíhnutí.

Hnízdění:

Hnízdo je na větvích těsně při kmeni 5-10 m nad zemí. Hnízdí na jehličnatých stromech. Hnízdí samostatně, teritoriálně a monogamně, ale ve vzácných případech se objevuje bigamie. Inkubační doba je 31-35 dnů. Samci mláďata nikdy nekrmí.

Zajímavosti:

Je velký jako hrdlička zahradní, rozpětí křídel dosahuje 60-80 cm. Samec je asi o čtvrtinu menší než samice. V letu se pozná podle širokých křídel, jejich rychlé údery střídá s krátkým plachtěním se v letu nikdy netřepotá na místě.